

Resezione della tonaca vaginale (Idrocele)

Resezione della tonaca vaginale (idrocele/spermatocele)

È una procedura che, attraverso una via di accesso scrotale permette di asportare formazioni cistiche a partenza dalla vaginale o dall'epididimo o dal funicolo spermatico

Indicazioni

- Idrocele
- Cisti dell'epididimo/Spermatocele
- Cisti del funicolo

Tecnica e decorso postoperatorio

È un intervento che viene frequentemente effettuato in sedoanalgesia (anestesia locale + sedazione) e in regime di Day Surgery.

Si effettua una incisione dello scroto attraverso la quale la cisti o l'idrocele vengono isolati ed asportati in toto o svuotati. Nel caso dell'idrocele, che non è possibile asportare in toto, la raccolta liquida viene svuotata e la tonaca vaginale, responsabile dell'accumulo liquido, viene parzialmente asportata.

Al termine dell'intervento viene applicato un drenaggio, di norma rimosso dopo 24 ore.

Possibili complicanze

- Infezione
- Ematoma (a volte così voluminoso da richiedere il reintervento)

[Scarica il pdf](#)

Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento.