

# IPSS\_prova

Questo test valuta la severità dei sintomi causati dall'ipertrofia prostatica, è uno strumento utile per comprendere e seguire nel tempo l'evoluzione della Sua condizione.

Please enter your email:

**1 - Incompleto svuotamento:** quante volte ha avvertito un senso di incompleto svuotamento della vescica dopo la minzione?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**2 - Frequenza:** quante volte ha urinato dopo meno di due ore dall'ultima minzione?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**3 - Intermittenza:** le è mai capitato di dover urinare in più tempi?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**4 - Urgenza:** quante volte ha avuto difficoltà a trattenere l'urina?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte

- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**5 - Flusso urinario debole:** quanto spesso il getto urinario le è parso debole?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**6 - Sforzo:** quante volte si è dovuto sforzare per iniziare ad urinare?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa le metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

**7 - Nicturia:** quante volte si è dovuto alzare durante la notte per andare ad urinare?

- Nessuna volta
- 1 volta
- 2 volte
- 3 volte
- 4 volte
- 5 o più volte

Vai al risultato

\_b7665afc0

\_0.0102650